

一般用医薬品（第1類）

ボルタレン AC テープ / 説明と注意

分類	外用鎮痛・消炎薬	
成分	ジクロフェナクナトリウム（100 g 中 1 g）	
効能	腰・肩・肘、関節、筋肉等の炎症や腫れ、痛み等の症状を緩和します。	
使用 方 法	成人（15歳以上）：1日1回1～2枚を患部に貼付してください。	
使 用 上 の 注 意	次の人は使用しないでください	<ul style="list-style-type: none"> ● 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 ● 喘息を起こしたことがある人。 ● 妊婦または妊娠していると思われる人。 ● 15歳未満の小児。
	次のことはしないでください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。 ● 次の部位には使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・目の周囲、粘膜等 ・湿疹、かぶれ、傷口 ・みずむし、たむし等、又は化膿している患部
	次の人は相談してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 医師の治療を受けている人。 ● 他の医薬品を使用している人。 ● 本人又は家族がアレルギー体質の人。 ● 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ● テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。 ● 次の診断を受けた人； 消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ ● 次の医薬品の投与を受けている人； ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤（アスピリン等）、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤 ● 高齢者
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 5～6日間使用しても症状が改善しない場合は相談してください。 ● 連続して2週間以上使用しないでください。 ● 1回当たり24時間を超えて貼り続けしないでください。 ● 添付文書は必ずお読みください。
アドバイス等	・	
使用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日		
薬局名		
薬局住所 TEL/FAX		
担当薬剤師		