

一般用医薬品（第1類）

エスタックイブファイン／説明と注意

分類	総合感冒薬	
成分	イブプロフェン 450mg・アンブロキシール 45mg・ジヒドロコデインリン酸塩 24mg・d l-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg・ヨウ化イソプロパミド 6mg・クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg・無水カフェイン 75mg・アスコルビン酸（ビタミンC）300mg・チアミン硝酸塩（ビタミンB1 硝酸塩）24mg (1日量9錠中)	
効能	かぜの諸症状（発熱・せき・のどの痛み・鼻水など）を緩和する薬です。	
使用方法	1回3錠、1日3回（朝・昼・夕）食後に服用してください。	
使用上の注意	次の人は使用しないでください	<ul style="list-style-type: none"> ● 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 ● 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛剤を服用してぜんそくが出た人 ● 15歳未満の小児
	次の人は相談してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 医師の治療を受けている人 ● 妊娠又は妊娠していると思われる人 ● 高齢者 ● アレルギー体質の人 ● 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ● 高熱・排尿困難の人 ● 高血圧・心臓病・糖尿病・緑内障・肝臓病・腎臓病・甲状腺機能障害・全身性エリテマトーデス・混合性結合組織病の診断を受けた人 ● 胃、十二指腸潰瘍・潰瘍性大腸炎・クローン病にかかったことのある人
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい。 ● 他のかぜ薬・解熱鎮痛薬・鎮静薬・鎮咳去痰薬・抗ヒスタミン薬を含有する医薬品を服用しないでください ● 授乳中の方は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合には授乳しないでください ● 服用時は飲酒しないで下さい ● 5日間を超えて服用しないで下さい ● 添付文書は必ずお読みください。
使用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日		
薬局名		
薬局住所 TEL/FAX		
担当薬剤師		