

ハイガード／説明と注意

分類	内服アレルギー薬	
成分	アゼラスチン塩酸塩（4錠中2mg）	
効能	<ul style="list-style-type: none"> ・花粉・ハウスダストなどによる、くしゃみ、鼻水、鼻づまり等の、鼻のアレルギー症状を緩和します。 ・じんましん・湿疹などによる皮膚の腫れ・かゆみを緩和します。 	
使用 方 法	成人（15歳以上）1回2錠、1日2回（朝食後及び就寝前）に服用してください	
使 用 上 の 注 意	次の人は使用しないでください	<ul style="list-style-type: none"> ● 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 ● 15歳未満の小児 ● 妊娠又は妊娠していると思われる人
	次のことはしないでください	<ul style="list-style-type: none"> ● 他のアレルギー薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬を服用しないでください ● 服用時は飲酒はしないでください ● 服用後、乗物又は機械類の運転操作はしないでください ● 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください ● 長期連用しないでください
	次の人は相談してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 医師の治療を受けている人 ● 高齢者 ● 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ● アトピー性皮膚炎、又はアトピー素因があると診断を受けた人 ● 気管支喘息の診断を受けた人 ● 発熱やせき、黄色で粘りのある鼻水などのかぜ症状がある人 ● アレルギーによるものか、かぜによるものかわからない鼻炎の人 ● 皮膚の症状がじんましん・湿疹によるものか、虫刺されや化膿等の原因によるものかわからない人 ● 鼻炎で2週間以上服用する人 ● 皮膚疾患は1週間以上、症状が継続する人
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮膚症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善が見られない場合、又は口の渇き、便秘、下痢、眠気の症状の継続、増強がみられた場合は直ちに服用を中止し医師又は薬剤師に相談してください ● 添付文書は必ずお読みください。
使用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日		
薬局名 薬局住所 TEL/FAX 担当薬剤師		