

一般用医薬品（第②類）

ボラギノール A 注入軟膏／説明と注意

分類	痔疾用外用薬	
成分	1 個（2 g）中 プレトニゾロン酢酸エステル 1mg、リトカイン 60mg、アラントイン 20mg、 ビタミン E 酢酸エステル 50mg	
効能	いぼ痔・きれ痔（さけ痔）の痛み、出血、腫れ、かゆみを緩和します。	
使用 方 法	成人（15 歳以上） ・ 肛門に注入する場合 1 日 1～2 回、1 回 1 個をゆっくり注入してください。 ・ 患部に塗布する場合 1 日 1～3 回適量を塗布してください	
使 用 上 の 注 意	次の人は使用しないで ください	<ul style="list-style-type: none"> ● 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 ● 患部が化膿している人 ● 15 歳未満の人
	次のことはしないでく ださい	<ul style="list-style-type: none"> ● 長期連用はしないでください
	次の人は相談してくだ さい	<ul style="list-style-type: none"> ● 医師の治療を受けている人 ● 妊娠又は妊娠していると思われる人 ● 本人又は家族がアレルギー体質の人 ● 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 10 日間位使用しても症状が改善しない場合は相談してください。 ● 添付文書は必ずお読みください。
アドバイス等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 便通をよくし、排便時無理にいきまないように注意しましょう。 ・ おしりの清潔にこころがけましょう。 	
使用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日		
薬局名 薬局住所 TEL/FAX 担当薬剤師		