

## 一般用医薬品（第②類）

## ドリエル／説明と注意

分類	睡眠改善薬	
成分	2錠中 ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg	
効能	寝つきが悪い、眠りが浅いなどの一時的な不眠の症状を緩和します。	
服用方法	成人（15歳以上）：1回2錠、1日1回就寝前に服用。	
使用上の注意	次の人は服用しないでください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 妊婦又は妊娠していると思われる人</li> <li>● 授乳中の人（服用する場合は授乳を避けてください）</li> <li>● 15歳未満の人</li> <li>● 日常的に不眠の人や不眠症の診断を受けた人</li> </ul>
	次のことはしないでください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 就寝前以外は服用しないでください。</li> <li>● 1回2錠を超えて服用しないでください。</li> <li>● 本剤を服用している間は、他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）は服用しないでください。</li> <li>● 服用後、車の運転や機械類の運転操作はしないで下さい。また、服用により翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じる場合は、これらの症状が消えるまで車の運転や機械類の運転操作はしないでください。</li> <li>● 服用時は飲酒しないでください。</li> <li>● 寝つきが悪い時や眠りが浅い時の服用にとどめ、連用しないでください。</li> </ul>
	次の人は相談してください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 医師の治療を受けている人</li> <li>● 高齢者</li> <li>● 本人又は家族がアレルギー体質の人</li> <li>● 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>● 排尿困難の症状のある人</li> <li>● 次の診断を受けた人 緑内障、前立腺肥大</li> </ul>
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2, 3回服用しても症状が改善しない場合は相談してください。</li> <li>● <b>添付文書は必ずお読みください。</b></li> </ul>
アドバイス等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・服用後は仕事や読書は行わず、すぐに就寝しましょう。</li> <li>・夕方から就寝前にはカフェインを含有するコーヒー、紅茶、チョコレート等の摂取は避けましょう。</li> <li>・就寝前の喫煙は避けましょう。</li> </ul>	
服用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日		
薬局名 薬局住所 TEL/FAX 担当薬剤師		