

## 一般用医薬品（第②類）

## ピタリット／説明と注意

分類	下痢止め薬	
成分	2錠中 塩酸ロペラミド 0.5mg、ベルベリン塩化物水和物 75 mg、 ビチアスターゼ 2,000 45mg、ビタミンB <sub>1</sub> 7.5 mg、ビタミンB <sub>2</sub> 3mg	
効能	下痢、食べ過ぎ・飲み過ぎによる下痢、寝冷えによる下痢、腹痛を伴う下痢、食あたり、水あたり、軟便の症状を緩和します。	
服用方法	15歳以上：1回2錠、1日2回まで。 下痢が止まったら服用しないでください。 服用間隔は4時間以上あけてください。	
使用上の注意	次の人は服用しないでください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>● 15歳未満の人</li> </ul>
	次のことはしないでください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本剤の服用中は胃腸鎮痛鎮痙薬を服用しないでください。</li> <li>● 服用後は、眠気が現れることがあるので、車の運転や機械類の運転操作はしないでください。</li> <li>● 服用時は飲酒しないでください。</li> </ul>
	次の人は相談してください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 医師の治療を受けている人</li> <li>● 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人、粘液便の続く人</li> <li>● 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人</li> <li>● 便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人</li> <li>● 妊婦または妊娠していると思われる人</li> <li>● 授乳中の人</li> <li>● 高齢者</li> <li>● 本人又は家族がアレルギー体質の人</li> <li>● 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> </ul>
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2～3日間服用しても症状の改善がみられない人は相談して下さい。</li> <li>● <b>添付文書は必ずお読みください。</b></li> </ul>
アドバイス等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 腹部や下肢の保温をして十分な睡眠をとりましょう。</li> <li>・ 冷たいものや刺激の強い食べ物は避け、消化のよい食事をとりましょう。</li> <li>・ 温かいお茶やスープ等いつもより多めに水分をとるようにしましょう。</li> </ul>	
服用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日		
薬局名 薬局住所 TEL/FAX 担当薬剤師		