

## 一般用医薬品（第1類）

## ガスター10 S錠／説明と注意

分類	H <sub>2</sub> ブロッカー胃腸薬	
成分	ファモチジン（1錠中10mg）	
効能	胃酸の分泌を抑え、胃痛や胸やけ、もたれ、むかつきなどの症状を緩和します。	
服用方法	15歳以上80歳未満：1回1錠服用。症状が治まらない場合は8時間以上あけて服用可。1日2回まで服用可。	
使用上の注意	次の人は服用しないでください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 妊婦または妊娠していると思われる人、授乳婦。</li> <li>● 15歳未満、80歳以上の人。</li> <li>● H<sub>2</sub>ブロッカーによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>● 血液の病気、腎臓・肝臓の病気、心臓の病気、胃・十二指腸の病気、喘息・リウマチ等の免疫系の病気の治療を受けている人。</li> <li>● ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤を服用している人。</li> <li>● 医師から赤血球が少ない（貧血）、血小板が少ない（血が止まりにくい、血が出やすい）、白血球が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人。</li> <li>● フェニルケトン尿症の人。</li> </ul>
	次のことはしないでください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本剤服用中は、他の胃腸薬を服用しないで下さい。</li> </ul>
	次の人は相談してください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。</li> <li>● 本人または家族がアレルギー体質の人。</li> <li>● 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>● 65歳以上の人。</li> <li>● のどの痛み、咳および高熱の症状、原因不明の体重減少、持続性の腹痛の症状がある人。</li> </ul>
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3日間服用しても改善しない場合は相談して下さい。</li> <li>● 2週間を超えて続けて服用しないで下さい。</li> <li>● 添付文書は必ずお読みください。</li> </ul>
服用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日		
薬局名 薬局住所 TEL/FAX 担当薬剤師		