

一般用医薬品（指定2類）

コルゲンコーワ鼻炎持続カプセル／説明と注意

分類	アレルギー用薬	
成分	4カプセル中(成人1日量) クロルフェニラミンマレイン酸塩 8.0mg、ベタドリン総アルカロイド 0.4mg、塩酸プロピトフェドリン 120.0mg、グリチルリチン酸 45.0mg、無水カフェイン 100.0mg	
効能	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状を緩和します。 くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い	
服用方法	成人（15歳以上）：1回2カプセル、1日2回 朝・夕食後服用 7歳以上15歳未満：1回1カプセル、1日2回 朝・夕食後服用	
使用上の注意	次の人は服用しないでください	<ul style="list-style-type: none"> ● 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 ● 7歳未満の人。 ● 前立腺肥大による排尿困難の症状がある人。 ● 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病の診断を受けた人。
	次のことはしないでください	<ul style="list-style-type: none"> ● 本剤を服用している間は、他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬）は服用しないでください。 ● 服用後は、眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状が現れることがあるので、乗物又は機械類の運転操作はしないでください。
	次の人は相談してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 医師の治療を受けている人。 ● 妊娠又は妊娠していると思われる人。 ● 高齢者 ● 本人又は家族がアレルギー体質の人。 ● 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ● 高熱・排尿困難・むくみの症状がある人。 ● 緑内障、腎臓病の診断を受けた人。 ● パーキンソン病用薬で治療を受けている人。
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 5～6日間服用しても症状の改善がみられない場合は相談してください。 ● 添付文書は必ずお読みください。
アドバイス等	<ul style="list-style-type: none"> ・外からの帰った後は洗顔・うがいを行いましょう。（花粉症） ・バランスのとれた食生活等、日常の生活管理が大切です。 	
服用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日	平成 年 月 日	
薬局名 薬局住所 TEL/FAX 担当薬剤師		